



Grandes Cultures

désherbage pour la qualité de l'eau, maladies et parasites

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



BRETAGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°20 du 15 septembre 2005 - 1 page

La mise en oeuvre du suivi phytosanitaire nécessaire pour la réalisation de ces bulletins est effectuée par la DRAF-SRPV et la FEREDDEC de Bretagne. Elle bénéficie du soutien du Conseil Régional de Bretagne.



Prochain bulletin : le 29 septembre 2005.

COLZA

Stade :

Semis à levée en cours.

La situation n'a guère évolué en 15 jours : les semis se poursuivent et les levées démarrent lentement et sont parfois partielles.

Limaces :

Elles sont actives dans les sols humides, ce qui est rarement le cas actuellement.

Petites altises :

Le risque concerne surtout les parcelles au stade cotylédons avec de faibles densités de levée. La destruction de repousses de colza à proximité est l'origine principale des infestations.

Limaces et petites altises sont les ravageurs à surveiller en priorité à ces stades fréquents de levée en cours-cotylédons. Les prochaines pluies pourraient entraîner une reprise d'activité des limaces. Observer attentivement les bords de parcelles dès le début de la levée et avec encore plus d'attention pour les zones où les densités de pieds par mètre carré sont réduites.

une moyenne de 1 pied sur 2 infesté.
Afin de mieux appréhender la situation et les pratiques à risque, communiquez-nous vos observations (voir précédent bulletin).




Photo 1 : galerie de pyrale et larve (parasitée)

Diabrotica :

La période de suivi des 80 pièges (20 par département) se termine dans la région. Aucune capture n'a été enregistrée.

Au niveau national, des captures ont eu lieu :
- en région Ile de France : près de 1000 individus sur 400 pièges (réseau renforcé suite aux piégeages de cet insecte dès 2002 dans les foyers de Roissy et d'Orly). Trois départements sont concernés : Seine et Marne, Essonne et Yvelines. Pour les anciens foyers, il n'y a pas eu de capture.
- En région Picardie, très récemment dans le sud ouest de l'Oise.

Colza :

Surveiller altises et limaces surtout en cas de levée lente et partielle.

Maïs :

Observer les attaques de pyrale.

MAIS

Pyrale :

Des premiers sondages larvaires ont eu lieu : les infestations sont souvent faibles, voire nulles. Les situations les plus touchées correspondent à des zones de maïs grain avec un broyage des cannes limités dans les maïs environnants à l'automne précédent. Sur une parcelle de centre Bretagne, on atteint ainsi



729^{1/1}